

**Wie kann finniges und trichinoeses
Fleisch für den menschlichen Genuss
unschädlich gemacht werden?**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des


Herrn Professors Dr. von Buhl

der medicinischen Facultät in München

vorgelegt von

Wilhelm Fruth

approb. Arzt und z. Z. Assistenzarzt im k. bayer. 12. Inf.-Reg.



München 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

**Wie kann finniges und trichinoeses
Fleisch für den menschlichen Genuss
unschädlich gemacht werden?**

~~~~~  
Inaugural-Dissertation

zur

**Erlangung der Doctorwürde**

in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des


**Herrn Professors Dr. von Buhl**

der medicinischen Facultät in München

vorgelegt von

**Wilhelm Fruth**

approb. Arzt und z. Z. Assistenzarzt im k. bayer. 12. Inf.-Reg.



**München 1880.**

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Seinem hochverehrten Lehrer

**Herrn Professor Dr. Otto Bollinger**

in Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.



Zu den bedeutenden Errungenschaften der Medicin gehören in der Neuzeit unbestritten die Resultate der Forschungen über Parasiten-Arten und -Formen. Erkrankungen, deren Ursachen und Erscheinungen früher dunkel und räthselhaft gewesen, haben durch sie ihre einfache und endgültige Lösung gefunden.

Im Allgemeinen richtet sich die Häufigkeit der Parasiten nach den Sitten und der Lebensweise der Menschen, nach ihrem Alter und Geschlechte, selbst nach der Religion. — So werden Kinder beispielsweise mehr von Parasiten geplagt, als Erwachsene; bei Geisteskranken sind sie sehr häufig.

In Bezug auf das zeitweise Vorkommen ist es nachgewiesen, daß Spulwürmer im Herbst häufiger sind; vom Bandwurm weiß man, daß er im Winter häufiger sich findet, als im Sommer und im Herbst. Bei den Hausthieren entstehen Parasitenerkrankungen häufig zu gewissen Jahreszeiten.

Es ist ein allgemeines Gesetz, daß die Häufigkeit der Parasiten im umgekehrten Verhältniß zur Höhe der Cultur eines Volkes steht.

Indem ich nach diesen Vorbemerkungen zu meinem Thema übergehe, möchte ich zunächst über das Vorkommen der hier zu besprechenden beiden Parasiten einige Worte vorausschicken.

Betrachten wir z. B. das Vorkommen der *Trichina spiralis*, so ergibt sich aus der Statistik, daß dieselbe am häufigsten

in Mitteleuropa sich findet und zwar in Mittel- und Norddeutschland, ferner in Schweden, in Rußland und in den unteren Donauländern. In Oesterreich ist sie selten, dergleichen am Rhein, ebenso in Süddeutschland nur vereinzelte Fälle, wie in Würzburg, Heidelberg, Hof, Wien.

Aus den Verhandlungen der bayerischen Aerztekammern ist als allgemein wichtiges Resultat zunächst hervorzuheben, daß die Verbreitung der Trichinose in Bayern eine größere ist, als früher angegeben wurde. Mit Einschluss einer im Februar 1879 in Unterfranken (Burgfinn) beobachteten Epidemie beträgt die Gesamtzahl der in Bayern bis jetzt constatirten Trichinenerkrankungen = 97, wovon 4 Fälle lethal verliefen. Diese Zahl vertheilt sich hauptsächlich auf acht Epidemien, von denen fünf allein im Jahre 1878 mit 72 Erkrankungen und eine im Jahre 1879 mit sieben Erkrankungen vorkamen. Auf die einzelnen Provinzen vertheilen sich diese 97 Fälle folgendermaßen:

Oberfranken = 55 Fälle.

Mittelfranken = 26 „

Unterfranken = 10 „

Pfalz = 6 „

Unter den Städten Bayerns liegt München einstweilen noch gerade im Centrum einer immunen Zone.

In Preußen fanden sich im Jahre 1876 unter den untersuchten Schweinen ca. 800 als trichinös. — Man hat auf Grund statistischer Zahlen angenommen, daß im Allgemeinen auf 8—10,000 Schweine ein trichinöses trifft; in Preußen auf 2000 Schweine ein trichinöses, in Schweden 3%, in Amerika 3—5%.

Und doch wird die größte Zahl der trichinösen Schweine ohne Schaden verzehrt. Von ca. 88 Schweinen, die trichinös waren, führt nur eines zu einer erheblichen Erkrankung des Menschen: In Sachsen ergab die Berechnung, daß von 100

trichinösen Schweinen höchstens 3 eine Infection beim Menschen bewirkten.

Ein Hauptgrund dieses verhältnißmäfsig geringen Procent-satzes liegt jedenfalls in den prophylaktischen Mafsregeln, die von Seite des Staates und der Privaten in den letzten 20 Jahren mit wachsendem Erfolge durchgeführt worden sind.

Die mikroskopische Fleischbefchau und die richtige Behandlung eines Parasiten bergen den Fleisches sind die Urfachen, warum selbst in Gegenden, wo die Erkrankungsziffer sonst eine hohe war, jetzt nur vereinzelte Fälle in der Literatur mitgetheilt werden. — Eine wichtige Frage der öffentlichen Hygiene und der Landwirthschaft nun ist immer noch die nach der Lebenstenacität des *Cysticercus cellulosae* und der *Trichina spiralis* beim Schweine, die von Thier zu Thier oder von Thier zu Mensch und zwar vornehmlich durch den Fleischgenufs mittheilbar sind. Erst die letzten Jahrzehnte haben die Fragen über die Behandlung von finnigem und trichinösem Fleische näher ventilirt. Demgemäfs ist auch die Literatur hierüber keine umfangreiche. \*)

Die Zubereitungsweisen des Schweinefleisches überhaupt spielen in der Aetiologie der Trichinen- und Finnenkrankheit eine nicht unbedeutende Rolle. Sie lassen sich auf einige wenige theils physikalische theils chemische Einwirkungen zurückführen, deren Tödtungswerth in Bezug auf Trichinen und Finnen ein verschiedener ist.

Solche Einwirkungen sind:

1. Mechanische Zerkleinerung, als Schneiden, Hacken, Wiegen des Fleisches. Wenn auch hiedurch ziemlich viele Finnen den mechanischen Tod finden, so bleibt doch in allen Fällen erfahrungsgemäfs die überaus grofse Mehrzahl intact. Die Angabe von Th. v. R e n z, dafs auch Trichinen bei einer solchen Behandlung getödet würden, glaube ich be-

---

\*) Ich verweise auf das am Schlusse befindliche Literaturverzeichnis.

zweifeln zu dürfen, da all' diese mechanischen Einwirkungen selbst auch das Schlagen dieselben intact lassen dürften. Dafs die Vermengung eines gehackten trichinigen Fleisches mit nicht trichinigen Fleischsorten die Gefahr verringert, versteht sich von selbst. — Es ist dieses blos deshalb erwähnenswerth, weil die meisten unserer süddeutschen Würste ein inniges Gemisch von Schweine-, Rind- und Kalbfleisch — mit Speck — darstellen.

2. Temperatureinwirkungen. Die Temperatur bei der die Trichine den Erfrierungstod stirbt wird nach Fiedler's Doppelversuch allgemein zu  $-11^{\circ}$  R. angegeben.

Ein längeres Aufbewahren kalt geräucherter Würste scheint den Eintrocknungstod der Trichinen herbeizuführen (nach Leisering).

Die Temperatur, bei der die Trichinen den raschen Hitzetod finden, beträgt  $50-55^{\circ}$  R. — Daraus zog man den allgemeinen Satz: Wenn ein Fleisch so gekocht oder gebraten wird, dafs auch die innersten Theile desselben 10 Minuten lang eine Temperatur von  $50-55^{\circ}$  R. auszuhalten hatten, so sind die darin befindlichen Trichinen todt; für die gewöhnliche Küche ist dies dann der Fall, wenn das Fleisch jeden Schein der ursprünglichen Blutfarbe verloren hat, also längere Zeit der Einwirkung siedenden Wassers ausgesetzt war. Da in den Dampfhäfen, (den sogenannten Papinianischen Töpfen), wenn die Hitze in ihnen, einmal in voller Wirkung, stets die Temperaturhöhe von  $80^{\circ}$  R. bedeutend überschritten wird, so wird durch diese Kochvorrichtung am Kürzesten und Sichersten etwa trichinöses Fleisch unschädlich gemacht.

Bei den Finnen haben die Versuche von Perroncito mit dem Schultze'schen Wärmetische ergeben, dafs eine Temperatur von  $48-50^{\circ}$  C. den Tod derselben herbeiführt.

3. Kochsalz tödtet, wenn es concentrirt und lange genug einwirkt, entschieden Trichinen wie Finnen.

In der Dresdener Veterinärſchule wurden ſchon am 31. Januar 1861 mit 2 Kaninchen und am 2. und 3. Februar mit einem Hunde Verſuche mit Pöckelfleiſch gemacht, das Küchenmeiſter von Dr. Waldeck aus Corbach erhalten hatte; es war mindeſtens 10 Wochen im Pöckel gelegen, Dem Hunde wurden am 11. und 12. Februar auch noch Stücke von trichinöſem Schinken, gleichfalls aus Corbach ſtammend, gereicht. Bei der am 21. Februar vorgenommenen Tödtung und Section dieſer Verſuchsthieſe wurden weder reife Trichinen-thieſe im Darne noch Trichinenlarven im Muskelfleiſche vorgefunden. Es erfolgten darüber verſchiedene Controverſen zwiſchen Küchenmeiſter, Rupprecht, Colberg, Leukart, Fiedler und Fürſtenberg.

Ich habe dieſe Pöckelverſuche deſhalb näher erörtert, weil es mir durch die Güte meiner hochverehrten Lehrer, des Herrn Profefſors Dr. von Buhl und des Herrn Profefſors Dr. Bollinger, ermöglicht wurde, ein neues Schnellpöckelungsverfahren mittelſt eines von Herrn Joh. Eckart, Fabrikant in München, conſtruirten Apparates in Bezug auf deſſen Einwirkung auf finniges und trichinöſes Fleiſch prüfen zu können.

4. Gewürze aller Art ſcheinen das Leben der Trichinen und Finnen in keiner Weiſe anzutaſten.

5. Räuchern als ſolches tödtet die Trichinen nicht.

Da es ſich dabei im Weſentlichen um die Imprägnation des Fleiſches (oder der Fleiſchfabrikate) mit Kreoſot handelt, daſelbe aber unmöglich bis in die innerſten Theile hinein einverleibt werden kann, weil ſonſt das Fleiſch ungenießbar würde, ſo tödtet der Prozeß der Räucherung nur durch Waſſerentziehung und bei vorausgegangener Pöckelung. Leuckart ſagte in ſeiner \*klaſſiſchen Arbeit: Durch den Prozeß der Räucherung werden, ſoweit meine Erfahrungen reichen, die Finnen weit vollſtändiger zerſtört, als die Trichinen. Der Blafenkörper fällt dabei nach Reſorption ſeiner Flüſſigkeit zuſammen und nimmt mit ſammt dem Kopfpapfen eine trübe

Befchaffenheit an. Selbst der Hohlraum, in dem die Finne gelegen ist, verliert seine frühere Weite. Bei Uebertragung solcher Finnen in die feuchte Wärme eines frischen Thiermagens — fährt er fort — habe ich selbst dann niemals Zeichen des Lebens beobachtet, wenn der Schinken (den ich zu diesem Zwecke exprefs aus meinen Versuchsthieren hatte bereiten lassen) ganz frisch war, noch viel weniger natürlich in später Zeit, wo die Finnen allmählig zu Körnchen von dem Durchmesser eines großen Stecknadelkopfes schrumpfen. — Für die Finnen stellte Professor Georg Pelizzari, Affeffor der öffentlichen Hygiene zu Florenz, gestützt auf seine Versuche, den Satz auf, daß dieselben in geradem Verhältniß zu der steigenden Kraft der Wärme, die Erscheinungen der Trübung, Volumabnahme, Schrumpfung des Körpers, Verlust der Elasticität, Zerdrückbarkeit zu käsigem Breie, darboten.

Der Kern der Frage, ob in einem gegebenen Falle die Parasiten getödtet sind, lag immer darin, ein sicheres Mittel ausfindig zu machen, um z. B. eine lebende Finne von einer todten zu unterscheiden.

Gewifs ist der directe Weg der Fütterungsversuche der aller sicherste, doch schwierig ist er und gefährlich. Nur wenige aufopferungswillige Menschen gibt es, die sich zu derartigen Versuchen gerne hergeben und den klinischen Beobachtungen steht nicht immer eine genaue und strenge Anamnese zur Seite.

Bei den Finnen und Trichinen handelt es sich noch dazu um Individuen, die auf einer embryonalen Entwicklungsstufe stehen, deren vitale Eigenschaften bisher sehr dunkel geblieben waren.

Aus ihren Cysten herausgehoben und bei der gewöhnlichen Temperatur beobachtet, führen sie keine Bewegungen aus oder es sind dieselben, wenn sie welche machen, so geringfügig, daß sie unserer sinnlichen Wahrnehmung entgehen. Nicht einmal unter Anwendung des electricchen Reizes zeigen sie bei gewöhnlicher Temperatur deutliche Lebenszeichen.

Vulpian gab einen sehr schätzbaren Wink, indem er darauf hinweist, daß sich lebende Gewebe von todtten wesentlich durch das verschiedene Imbibitionsvermögen für farbende Substanzen auszeichnen.

Bringt man lebende Larven von Wasserinfecten (*Chironomus plumosus*, *Corethra plumicornis* u. s. w.) in Wasser, das durch eine neutrale oder fast neutrale wässerige Carmin-tinktur gefärbt ist, so daß diese Flüssigkeit keine chemische Einwirkung auf die Gewebe auszuüben vermag, so sieht man, daß die Larven hierin sogar ziemlich lange verweilen können, ohne sich merklich zu färben. Waren aber die zu diesem Versuche genommenen Larven bereits todt, bevor sie in die farbige Flüssigkeit kamen, so färbten sie sich bald in ihrer ganzen Dicke. Diese Thatfache bestätigten Perroncito und andere Forscher an vielen Helminthenpräparaten.

Wenn man z. B. zwei Zellgewebscyficerken vom Schweine nimmt und den in den Hals zurückgezogenen Kopf vorsichtig hervorzieht, hierauf einen derselben tödtet, indem man ihn der im Obigen erwähnten Temperatur aussetzt und beide Exemplare gleichzeitig in neutrale Carmin-tinctur oder in Hamatoxylin legt, so findet man nach  $\frac{3}{4}$  Stunden und mitunter noch früher die todtte Finne intensiv roth oder blau gefärbt, während das lebende Exemplar mehr als 1 oder 2 Stunden darin verweilen kann, ohne daß es zur Imbibition seines Körpers kommt. Nimmt man die lebende Finne nach  $\frac{3}{4}$ —1—2 Stunden (bevor sie durch die Eintauchung in die Flüssigkeit getödet worden) aus der Tinctur heraus und wäscht sie in destillirtem Wasser, so findet man gewöhnlich nur die Gewebe der Schwanzblase imbibirt, während der übrige aus Hals und Kopf bestehende Körper ungefärbt erscheint oder höchstens eine leichte oberflächliche und ungleichmäßige Färbung zeigt. Nie aber erfolgt in diesen Theilen bei lebenden Thieren eine wahre Imbibition und in Fällen, wo das Leben der Cyficerken allmählig erlischt, sieht man die Färbung nach und nach vom hinteren

Theile zum vorderen fortchreiten, der Kopf widersteht der Imbibitionskraft am meisten und so lange das Thier nicht todt ist, bleibt es farblos. Ist aber einmal der Tod erfolgt, so färbt sich gerade der Kopf intensiver, als die übrigen Bestandtheile des Cysticerkus.

Daselbe gilt vom *Cysticercus pisiformis*, vom *C. tenuicollis*, von den Scolices des *Coenurus* und vom *Echinococcus*.

Noch deutlicher tritt die Imbibitionsenergie an den Bandwürmern zu Tage, die nach 40—45 Minuten aus der Flüssigkeit herausgenommen, falls sie todt, lebhaft blau oder roth ausfahlen.

Die günstigen Resultate, die Vulpian und Perroncito bei ihren Untersuchungen mit dieser Färbe-Methode erzielten, veranlaßten Profeffor Bollinger<sup>1)</sup> dieselbe bei trichinösem Fleische zu prüfen, welches in dem Eckart'schen Apparate behandelt worden war.

Nachdem Profeffor Bollinger schon derartige Untersuchungen angestellt hatte, veranlaßte er mich, dieselben fortzusetzen und die Resultate in dieser Differtation zu veröffentlichen.

Der Eckart'sche Apparat besteht aus einem stark eisernen cylindrischen Kessel, der oben mit einem Mantellochdeckel versehen ist, welcher nach der jedesmaligen Füllung mittelst zweier Stellklammern luftdicht angepaßt werden kann; ferner aus einem gewöhnlichen Manometer und einer fogen. Speisepumpe, (vergl. d. Abbildung.) Sein Versuchsapparat faßt etwa 1 Zentner Fleisch, jedoch hat er Apparate in verschiedener Größe. — Die Hälfte des Apparates wird nun für gewöhnlich mit der desinficirenden Flüssigkeit (Chlornatrium, Bor-Salicylsäure-Lösung), in meinem Versuche mit gesättigter Kochsalzlösung gefüllt und dann soviel Fleisch zugegeben, bis der ganze Apparat voll ist. Der Deckel wird luftdicht ge-

---

<sup>\*)</sup> Bollinger, Verhandlungen der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie zu München.

geschlossen und durch die Speisepumpe von der nemlichen Flüssigkeit, die im Kessel sich befindet, solange nachgepumpt, bis das Manometer einen Druck von 12 Atmosphären angibt. 20 Atmosphären hält fein Versuchsapparat Druck aus, für die Pöckelung jedoch genügen deren 12. Die Dauer derselben kann beliebig genommen werden, je nachdem es der Inhalt benöthigt.

Bei meinem Versuche waren die Fleischtheile von 12—48 Stunden im Apparate.

Nachdem sowohl finniges wie trichinöses Fleisch auf die angegebene Weise präparirt worden war, erhielt ich es zur genaueren Untersuchung.

Ueber die Technik meiner Versuche muß ich zuvörderst bemerken, daß ich nach dem Vorgange Perroncito's und Bollinger's ebenfalls die unentbehrliche Hervorftülpung der zumeist in ihre Schwanzblase oder ihren Körper eingezogenen Cysticerken am zweckmäßigsten einfach manuell ausführte und zwar durch vorsichtigen allmählich steigenden Druck zwischen Daumen und Zeigefinger einer Hand. Oefters wird dabei freilich die Schwanzblase gesprengt, eingerissen oder gar auch gänzlich abgerissen; doch hat dieses keinen nachtheiligen Einfluss auf die unter dem Mikroskope zu beobachtenden Bewegungen oder die Färbung der Thiere. Die Präparate kamen sodann auf den gläsernen Objectträger in einen Tropfen Wasser oder dünner Kochsalzlösung. Bei dem trichinösen Fleische machte ich einfache Zupfpräparate.

Als Färbemittel bediente ich mich einer neutralen Carmininctur.

Die Versuche wurden mit Unterbrechungen ausgeführt, von besonderem Interesse waren folgende:

#### 1. Beobachtung.

Den 6. November 1879 wurde von einem Schweine ein Stückchen vom Zwerchfelle genommen, das Cysticerken enthielt und 12 Stunden dem Schnellpöckelungsverfahren unterworfen.

Nachdem ein Cyftickerkus in der oben beschriebenen Weise präparirt war, wurde er in die Carmintinctur eingelegt. Nach  $\frac{1}{4}$  Stunde zeigte sich bei der Herausnahme nur am Halfe beginnende Färbung.

### 2. Beobachtung.

Die Finnen wurden dießmal, nachdem sie aus der Carmin-tinctur nach verschiedenen Zeitabschnitten herausgenommen waren, in destillirtem Wasser ausgewaschen und dann unter das Mikroskop gebracht. Es ergab sich:

| bei frischfinnigem Fleische :                                       | nach 12 stündiger                            | nach 48 stündiger                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Einlage in Carmin $\frac{1}{2}$ 3 Uhr.                              | 3 Uhr.                                       | Pöckelung :                                                                            |
| Herausnahme $4-\frac{3}{45}$ „                                      | $\frac{3}{44}-4\frac{1}{2}$ „                | $3\frac{1}{4}$ Uhr Nachm.                                                              |
| Schwanzblase zeigt oberflächliche Färbung, Körper und Hals farblos. | Intensivere Färbung nur an der Schwanzblase. | $\frac{3}{44}-\frac{3}{45}$ „ „ Deutliche Färbung am Kopfe insbesondere die Saugnäpfe. |

### 3. Beobachtung.

Nachdem dieselben Vorbereitungen als Ausstülpung u. f. w. getroffen, sieht man :

| bei frischfinnigem Fleische :                                                         | nach 12 stündiger                                                                    | nach 48 stündiger                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einlage in Carmin 2 Uhr.                                                              | $2\frac{1}{4}$ Uhr.                                                                  | Pöckelung :                                                                                                          |
| Herausnahme 3 „                                                                       | 3 „                                                                                  | $2\frac{1}{2}$ Uhr Nachmittags.                                                                                      |
| Ungleichmäßige oberflächliche Färbung an der Schwanzblase, Hals, Kopf bleibt farblos. | Ungleichmäßige Färbung an Körper, Hals und Kopf, Imbibition nur an der Schwanzblase. | $3\frac{1}{4}$ „ „ Färbung intensiv roth besonders Kopf, manchmal schwächere Färbung selbst bei nicht ausgestülpter. |

### 4. Beobachtung.

Hier wurden mehrere Exemplare jedesmal zugleich auf das Objectglas genommen; zugleich wurde dabei auch trichinöses Fleisch mit untersucht. Es fand sich :

| bei frischfinnigem Fleische :                                                            | nach 12 stündiger                                                           | nach 48 stündiger                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Einlage in Carmin 3 Uhr.                                                                 | $3\frac{1}{4}$ Uhr.                                                         | Pöckelung :                                                            |
| Herausnahme $\frac{3}{44}$ „                                                             | 4 „                                                                         | $3\frac{1}{2}$ Uhr Nachmittags.                                        |
| Etwas ungleichmäßige Färbung des Gewebes der Schwanzblase, Kopf und Hals nicht imbibirt. | Vollständige Imbibition der Schwanzblase, um Hals & Kopf einen rothen Saum. | 4 „ „ Intensive Färbung, namentlich die Saugnäpfe bei zwei Präparaten. |

Die untersuchten trichinösen Fleischpartikelchen dagegen ergaben jedesmal negatives Resultat, gleichgültig wie lange

daselbe im Apparate gewefen, niemals trat eine völlige Imbibition des Präparates an irgend einem Theile ein. Es fcheint fomit, als ob die Trichinen durch das Schnellpöckelungsverfahren nicht getödtet würden.

Um nun in jedem Falle ficher zu gehen, betrat ich noch den directen Weg der Fütterungs- resp. Erziehungsversuche. Ueberzeugt, dafs die Finnen nach mindestens 48 stündiger Pöckelung im Eckart'schen Apparate sterben, gelang es diese Thatfache am Menschen zu beweisen.

Es gelang Herrn Profeffor Dr. Bollinger zwei Männer zu finden, die den Versuch an sich ausführen liefsen.

Herr F....., Studirender an der hiesigen Thierarzneischule hatte die Liebenswürdigkeit und den Muth, sich hiezu herzugeben, desgleichen noch ein Mann aus dem Volke, der durch die gütige Vermittlung des Herrn cand. med. Knell gegen geringe Entschädigung hiefür gewonnen wurde.

Beide genossen Anfang November 1879 von finnigem Fleische, das im Eckart'schen Apparate gepöckelt wurde.

Jetzt sind bereits  $4\frac{1}{2}$  Monate verflossen und Keiner hat bis heute ein Symptom verspürt, das auf die Entwicklung des Bandwurms in seinem Darne deutete, auch ist in den künstlich erzeugten (Flores Kufso) Entleerungen vergebens nach Proglottiden gefahndet worden, so dafs in diesen Fällen das Eckart'sche Verfahren seine Feuerprobe bestanden haben dürfte.

Dafs die Trichinen im Gegenfatze zu den Finnen durch die Behandlung im Eckart'schen Apparate nicht getödtet werden, wurde gleichfalls durch Fütterungsversuche bestätigt, indem in der königlichen Centralthierarzneischule in München durch Profeffor Bollinger folgende zwei Versuche für mich gemacht wurden.

#### I. Versuch.

Am 1. November 1879 wurde ein Schwein mit einer trichinösen Ratte, die 12 Stunden lang im Eckart'schen

Apparate gepöckelt worden, gefüttert. Die Section des am 17. Januar 1880 getödteten Schweines ergab das Bild einer „allgemein verbreiteten Trichinose.“

## II. Versuch.

Am 3. November 1879 wurde ein zweites gefundes Schwein ebenfalls mit einer trichinösen Ratte gefüttert, welche 48 Stunden im Eckart'schen Apparate gelegen war.

Die Section des am 21. Januar 1880 getödteten Schweines ergab: „Allgemein mäfsige Trichinose.“

Fassen wir jetzt die Ergebnisse aller Versuche bezüglich des Schneltpöckelungsverfahrens nach Eckart zusammen, so ergibt sich, dafs daselbe in Bezug auf die Pöckelung finnigen Fleisches bei mindestens 48 stündiger Einwirkung die günstigen Erfolge aufzuweisen hat: „Die Finnen werden dadurch sicher getödtet.“

Wenn wir nun aus der Statistik ersehen, dafs in Berlin unter 5360 getödteten Schweinen 87 finnige waren, und im Münchener Schlachthause im Jahre 1879 unter 82,966 getödteten Schweinen 209 mit Finnen behaftet waren, so dürfte die Zweckmäfsigkeit des Eckart'schen Verfahrens für gröfsere Schlachthäuser, in denen ja doch Controle in sanitätspolizeilicher Hinsicht geübt wird, wohl in die Augen springen.

Was die Einwirkung des Schneltpöckelungsverfahrens auf trichinöses Fleisch betrifft, so scheint nach obigen Versuchen eine 48 stündige Pöckelung hier nicht zu genügen.

Eine 10 wöchentliche Pöckelung nach dem Vorschlage Küchenmeisters dürfte hinwiederum dem Fleische fast allen Nährwerth entziehen.

In practischer Hinsicht wird es sich nun darum handeln, in wie weit finniges Fleisch nach dem Schneltpöckelungsverfahren noch ausgenützt werden kann.

Wenn man aber ohne alle Gefahr den Genufs gekochten und hinreichend gepöckelten finnigen Fleisches erlauben darf,

so ist es nicht minder wahr, daß ein solches Fleisch immerhin ein Nahrungsmittel von geringerem Handelswerth abgibt, weil man vielfach Abneigung gegen finniges Fleisch hegt. Daß jedoch das Fleisch beim Schnellpöckelungsverfahren noch hohen Nährwerth hat, ergeben die Untersuchungen, die Dr. Rubner und Dr. E. Voit im physiologischen Institute in München darüber angestellt. — Nun werden bei und in München aber alle finnigen Schweine, soviel man ihrer habhaft werden kann, in die Leim- und Seifenfabriken verkauft, wo das Pfund um höchstens 12—15 Pfennige bezahlt wird. Wirthschaftlich jedoch ist es von großer Bedeutung, wenn es verkauft werden kann, wenn sich auch der Preis nur auf ein Drittel des gewöhnlichen Marktpreises beliefe.

Bei uns wird eine solche Strenge gegen finniges und trichinöses Fleisch geübt und doch andererseits gestattet, daß jährlich so und so viele tausend Pfunde amerikanisches Fleisch und sogenannte Speckseiten importirt werden. Die Gefährlichkeit der aus Amerika importirten Schinken nur in Bezug auf Trichinen ergibt sich schon aus folgenden Zahlen.

Die Schinken wurden trichinös befunden: in Ludwigshafen zu ein Procent, in Chicago und Rostock zu zwei Procent, in Gothenburg zu vier Procent, in Elbing zu fünf Procent, in Heilbronn zu acht Procent, in Bamberg zu drei Procent, in Basel zu drei Procent.

Auch dieses Fleisch ist oft nur gepöckelt mit viel weniger Garantien gegen Ansteckung und es wird von so Vielen genossen.

Es wäre daher zu wünschen, daß wenigstens **finniges** Fleisch in solchen Fällen, wo die Finnen in mäßiger Anzahl vorhanden sind — und die sind weitaus die häufigsten — nach geschehener Tödtung der Finnen irgend wie zum menschlichen Genuße zugelassen würde.

Hochgradig finniges Fleisch wäre auf alle Fälle als

eckelhaft von dem menschlichen Genuße auszuschließen und höchstens nur zur Benützung des vorgängig auf 70—100° C, erwärmten Fettes zu verwenden.

So bliebe es dann dem Besitzer freigestellt unter Aufsicht der öffentlichen Sanitätsgefetze den größtmöglichen Nutzen von feinen Thieren zu ziehen.

Für Schlachthäuser und Stellen, wo viel Fleisch importirt würde, hätte aber das neue Schnellpöckelungs-Verfahren, verbunden mit der Färbe-Methode bei der mikroskopischen Fleischbefchau den Vortheil der Schnelligkeit, Sicherheit und Einfachheit, wenn es sich darum handelt, die Finnen für den menschlichen Genuß unschädlich zu machen.

---

## Literatur.

---

- R. Leukart: Die menschlichen Parasiten und die von ihnen her-  
rührenden Krankheiten. Leipzig 1863.
- Heller: (Ziemssens Handb. d. spec. Pathologie und Therapie,  
Band III. 1876.
- A. Zürn: Die Schmarotzer auf und in dem Körper unserer Haus-  
säugethiere.
- E. Perroncito: Vortrag geh. in der kgl. landwirthschaftlichen  
Akademie zu Turin, Sitzung vom 24. März 1876.
- Bollinger: Verhandlungen der Gesellschaft für Morphologie und  
Physiologie 1879.
- Bollinger: Zur Prophylaxe der Trichinose in der deutschen  
Zeitschrift für Thiermed. und vergl. Pathologie B. V.  
S. 1 und 204. 1879.
- Küchenmeister: Zeitschrift für Medizin, Chirurgie und  
Geburtshülfe.
- Virchow's Archiv Band XXXII. S. 371.
- „ „ Band XVIII S. 561.
- Möhlendorf: Berlin, klin. Wochenschrift 1864 Nr. 37.
- Lewis: London, Medical Record, Oktober- und Novemberheft 1874.
- Th. v. Renz: Mittheilungen aus meiner Praxis, Wildbad 1875.
- Pelizzari: Vortrag, geh. in der Florentiner Academie 1874.
- Böhler: Die Trichinenkrankheit und die Behandlung in Plauen 1863.
- Wagner: Chemische Technologie, Leipzig 1859, 4. Auflage,  
S. 475 und 540.
-





